


# VOUS (OU L'UN DE VOS PROCHES) AVEZ UNE INFECTION A *CLOSTRIDIUM DIFFICILE*




Réf : 1140

## Qu'est ce que *Clostridium Difficile* ?

C'est une bactérie connue depuis longtemps, vivant habituellement dans l'environnement. L'homme sain peut en être porteur dans son tube digestif (3%). A l'hôpital, on la retrouve souvent à l'origine de diarrhée. Des formes sévère peuvent être observées mais restent rares.

## Quelles sont les modes de transmissions ?



## Quels sont les principaux facteurs de risque ?


- Prise d'antibiotiques
- Âge élevé
- Baisse des défenses immunitaires
- Séjour prolongé à l'hôpital



## Traitement

Si vous avez une diarrhée simple, elle cessera le plus souvent à l'arrêt du traitement antibiotique. Si votre cas est plus sévère, un traitement spécifique sera prescrit.

# VOUS (OU L'UN DE VOS PROCHES) AVEZ UNE INFECTION A *CLOSTRIDIUM DIFFICILE*




Réf : 1140

## Qu'est ce que *Clostridium Difficile* ?

C'est une bactérie connue depuis longtemps, vivant habituellement dans l'environnement. L'homme sain peut en être porteur dans son tube digestif (3%). A l'hôpital, on la retrouve souvent à l'origine de diarrhée. Des formes sévère peuvent être observées mais restent rares.

## Quelles sont les modes de transmissions ?



## Quels sont les principaux facteurs de risque ?

- Prise d'antibiotiques
- Âge élevé
- Baisse des défenses immunitaires
- Séjour prolongé à l'hôpital



## Traitement

Si vous avez une diarrhée simple, elle cessera le plus souvent à l'arrêt du traitement antibiotique. Si votre cas est plus sévère, un traitement spécifique sera prescrit.

# PRECAUTIONS RECOMMANDÉES



En hospitalisation de courte et moyenne durée : Afin d'éviter la transmission de la bactérie, vous devez être placé en chambre seule ou dans un secteur dédié. Ces précautions durent jusqu'à l'arrêt de la diarrhée. Une signalisation peut être apposée sur la porte de votre chambre.

## Mesures pour le patient

- Lavage des mains avec un savon doux après passage aux toilettes et avant repas



## Mesures pour les visiteurs

- Lavage des mains avec un savon doux en sortant de la chambre
- Ne pas utiliser les toilettes de la chambre

## Mesures pour le personnel

- **Désinfection** des mains à l'entrée de la chambre
- **Lavage et désinfection (SHA)** à la sortie de la chambre
- Port de gants lors des soins
- Port de surblouse à manches longues à usage unique dès l'entrée dans votre chambre et à retirer avant la sortie
- Utilisation de matériel médical dédié pendant votre séjour (thermomètre, tensiomètre, bassin urinal...)



## Retour au domicile

Au retour à domicile, aucune précaution particulière n'est recommandée en dehors du lavage des mains après le passage aux toilettes et avant les repas.

Si une nouvelle diarrhée survenait, en particulier après la prise d'antibiotiques, il est recommandé d'informer votre médecin de votre antécédent d'infection à *Clostridium difficile*.

## Retour en maison de retraite ou EHPAD

Les mesures essentielles de prévention de la transmission doivent être appliquées : lavage au savon doux et entretien de la chambre et des sanitaires avec un produit adapté.



Si ces informations soulèvent des questions, le personnel soignant est prêt à y répondre. N'hésitez pas à vous adresser à eux.

# PRECAUTIONS RECOMMANDÉES



En hospitalisation de courte et moyenne durée : Afin d'éviter la transmission de la bactérie, vous devez être placé en chambre seule ou dans un secteur dédié. Ces précautions durent jusqu'à l'arrêt de la diarrhée. Une signalisation peut être apposée sur la porte de votre chambre.

## Mesures pour le patient

- Lavage des mains avec un savon doux après passage aux toilettes et avant repas



## Mesures pour les visiteurs

- Lavage des mains avec un savon doux en sortant de la chambre
- Ne pas utiliser les toilettes de la chambre

## Mesures pour le personnel

- **Désinfection** des mains à l'entrée de la chambre
- **Lavage et désinfection (SHA)** à la sortie de la chambre
- Port de gants lors des soins
- Port de surblouse à manches longues à usage unique dès l'entrée dans votre chambre et à retirer avant la sortie
- Utilisation de matériel médical dédié pendant votre séjour (thermomètre, tensiomètre, bassin urinal...)



## Retour au domicile

Au retour à domicile, aucune précaution particulière n'est recommandée en dehors du lavage des mains après le passage aux toilettes et avant les repas.

Si une nouvelle diarrhée survenait, en particulier après la prise d'antibiotiques, il est recommandé d'informer votre médecin de votre antécédent d'infection à *Clostridium difficile*.

## Retour en maison de retraite ou EHPAD

Les mesures essentielles de prévention de la transmission doivent être appliquées : lavage au savon doux et entretien de la chambre et des sanitaires avec un produit adapté.



Si ces informations soulèvent des questions, le personnel soignant est prêt à y répondre. N'hésitez pas à vous adresser à eux.